



ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

รหัสสมาชิก 7-11000-023

ทะเบียนพรรณไม้

โรงเรียนสตรีรัตนบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสสมาชิก 7-11000-023

| รหัสพรรณไม้ | ชื่อพื้นเมือง | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | ลักษณะวิสัย | ลักษณะเด่นของพืช | บริเวณที่พบ |
|--------------------|---|--|------------------|-------------|---|-------------------------------------|
| 7-11000-023-027/6 | ลักเกลือลักเคย (ภาคใต้), ราช พฤษ์ คุน (ภาค กลาง), สมแล้ง (ภาคเหนือ) | <i>Cassia fistula</i> L. | FABACEAE | ไม้ต้น | ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อ ฝักยาวสีดำหรือน้ำตาล | พื้นที่ 2 อาคาร 2 พื้นที่ 7 สนาม |
| 7-11000-023-028/10 | กูดสร้อย (เหนือ), เนระโพ สี (เลย) | <i>Nephrolepis cordifolia</i> C. Presl | LOMARIOPSIDACEAE | เฟิน | ใบแตกเป็นกอ มีไหลยาว มีขนปกคลุม | พื้นที่ 2 อาคาร 2 |
| 7-11000-023-029/3 | ลีลาวดี (ภาค กลาง), ลั่นทม , จำปาขาว (ภาค อีสาน), จำไป (เขมร), จำปาหอม (ภาคใต้) | <i>Plumeria rubra</i> L. | APOCYNACEAE | ไม้ต้น | ใบรูปไข่กลับ ดอกช่อสีชมพู มีน้ำยางสีขาวขุ่น | พื้นที่ 1 อาคาร 1 |

| รหัสพรรณไม้ | ชื่อพื้นเมือง | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | ลักษณะวิสัย | ลักษณะเด่นของพืช | บริเวณที่พบ |
|--------------------|---|--|------------|-------------|---|--|
| 7-11000-023-030/68 | ถั่วพุ่ม ถั่วฝักยาว (ภาคกลาง), ถั่ว กระด้าง (ขอนแก่น), ถั่วปี ถั่วพุ่มดำ ถั่ว พุ่มฝักนิ่ม ถั่ว สันตือ (เชียงใหม่) | <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. subsp. <i>unguiculata</i> | FABACEAE | ไม้ล้มลุก | ใบมีสามใบย่อย ดอกรูปถั่ว สีม่วง ฝักยาว 15-20 เซนติเมตร | พื้นที่ 1 อาคาร 1 พื้นที่ 2 อาคาร 2 พื้นที่ 4 อาคาร 4 |
| 7-11000-023-031 | หม่อน (ทั่วไป) | <i>Morus alba</i> L. | MORACEAE | ไม้ต้น | ดอกช่อสีขาว ผลกลุ่มสีแดงหรือแดงเข้ม รับประทาน ได้ | พื้นที่ 6 อาคารพยาบาล- อาคารวิทยาศาสตร์ |
| 7-11000-023-032/6 | ตีปัส (ทั่วไป) | <i>Piper retrofractum</i> Vahl | PIPERACEAE | ไม้เลื้อย | มีรากฝอยบริเวณข้อใช้ยึดเกาะ ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่ สีแดง | พื้นที่ 6 อาคารพยาบาล- อาคารวิทยาศาสตร์ |

| รหัสพรรณไม้ | ชื่อพื้นเมือง | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | ลักษณะวิสัย | ลักษณะเด่นของพืช | บริเวณที่พบ |
|--------------------|---|--|---------------|-------------|---|---|
| 7-11000-023-033/7 | นนทรี (ทั่วไป), กระถินป่า กระถินแดง (ตราด) , สารเงิน (เชียงใหม่, ภาคเหนือ) | <i>Peltophorum pterocarpum</i> (DC.) Backer ex K. Heyne | FABACEAE | ไม้ต้น | ดอกช่อสีเหลือง ผลแก่แบนบาง แห้งไม่แตก สีแดง | พื้นที่ 7 สนาม |
| 7-11000-023-034/31 | เฟื่องฟ้า (ทั่วไป), ดอกต่างใบ ศรี ราชา (ภาค กลาง) , ดอก กระต๊าก ดอก โคม (ภาคเหนือ) | <i>Bougainvillea spectabilis</i> Willd. | NYCTAGINACEAE | ไม้รอเลื้อย | ดอกมีใบประดับสามใบ ใบไม่มีขนหรือมีเล็กน้อย | พื้นที่ 6 อาคารพยาบาล- อาคารวิทยาศาสตร์ |
| 7-11000-023-035/8 | โมกบ้าน โมก ซ้อน (ภาค กลาง), ปิดจงวา (เขมร-สุรินทร์), หลักป่า (ระยอง) | <i>Wrightia religiosa</i> Benth. | APOCYNACEAE | ไม้พุ่ม | ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม ดอกช่อ กลีบดอก 5 กลีบ มี กลิ่นหอม | พื้นที่ 1 อาคาร 1 พื้นที่ 2 อาคาร 2 พื้นที่ 3 อาคาร 3 พื้นที่ 4 อาคาร 4 |

| รหัสพรรณไม้ | ชื่อพื้นเมือง | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | ลักษณะวิสัย | ลักษณะเด่นของพืช | บริเวณที่พบ |
|--------------------|--|----------------------------------|-----------------|-------------|---|--|
| 7-11000-023-036/45 | อัญชัน (ภาคกลาง), เอื้องชัน (ภาคเหนือ), แดงชัน (เสียงในชนบท) | <i>Clitoria ternatea</i> L. | FABACEAE | ไม้เลื้อย | ต้นและใบมีขน ใบประกอบแบบขนนก ดอกเดี่ยวหรือช่อ ดอกรูปถั่วสีม่วง ฝักแบน | พื้นที่ 3 อาคาร 3 |
| 7-11000-023-037/5 | ต้อยติ่งฝรั่ง ต้อยติ่งเทศ ต้อยติ่งน้ำ (ภาคกลาง) | <i>Ruellia simplex</i> C. Wright | ACANTHACEAE | ไม้ล้มลุก | ดอกช่อ รูปแตรปลายแยก 5 แฉก สีม่วง | พื้นที่ 3 อาคาร 3 |
| 7-11000-023-038/5 | โคลงเคลง (ทั่วไป), กะดุดู (มาเลย์-สงขลา), มังเคร่ซ้าง (ภาคใต้) | <i>Melastoma sanguineum</i> Sims | MELASTOMATACEAE | ไม้พุ่ม | กิ่งมีขน ผลสีม่วงกลีบดอกแยก มีขนมาก | พื้นที่ 2 อาคาร 2 |
| 7-11000-023-039/3 | เทียนกิ่ง เทียนขาว เทียนข้าวเปลือก เทียนแดง (ภาคกลาง) | <i>Lawsonia inermis</i> L. | LYTHRACEAE | ไม้พุ่ม | ดอกช่อ ช่อเป็นกระจุกแน่น ช่อดอกยาว ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ผลสีเขียว | พื้นที่ 6 อาคารพยาบาล- อาคารวิทยาศาสตร์ |

| รหัสพรรณไม้ | ชื่อพื้นเมือง | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | ลักษณะวิสัย | ลักษณะเด่นของพืช | บริเวณที่พบ |
|--------------------|--|--|--------------|-------------|---|-------------------|
| 7-11000-023-040 | เข็มเหลือง (ทั่วไป) | <i>Ixora</i> sp. | RUBIACEAE | ไม้พุ่ม | ใบออกเป็นคู่ตรงข้ามกัน ดอกช่อ สีเหลือง ขนาดใหญ่ | พื้นที่ 4 อาคาร 4 |
| 7-11000-023-041/52 | ปริกทางกระรอก (ทั่วไป) | <i>Asparagus mairei</i> H. Lév. | ASPARAGACEAE | ไม้พุ่ม | ใบรูปเข็ม เวียนรอบลำต้น ดอกสีขาว รูปประฆัง ก้านดอกสั้น | พื้นที่ 1 อาคาร 1 |
| 7-11000-023-042/3 | อินทนิลน้ำ, อินทนิล (ภาค กลาง,ภาคใต้) , ตะแบกคำ (กรุงเทพ) | <i>Lagerstroemia speciosa</i> (L.) Pers. | LYTHRACEAE | ไม้ต้น | ดอกช่อ ก้านดอกยาว สีม่วง ดอกอ่อนมีจุกสั้นๆ ผล แข็ง แห้งแตก | พื้นที่ 7 สนาม |
| 7-11000-023-043/5 | จำปา (ภาค กลาง), จำปากอ (มลายู-ใต้) , จำปาทอง (นครศรีธรรมราช) , จำปาเขา (ตรัง) | <i>Magnolia champaca</i> (L.) Baill. ex Pierre var. <i>champaca</i> | MAGNOLIACEAE | ไม้ต้น | ยอดอ่อนมีใบเกล็ดหุ้ม ดอกเดี่ยว กลีบดอกสีเหลืองส้ม | พื้นที่ 3 อาคาร 3 |

| รหัสพรรณไม้ | ชื่อพื้นเมือง | ชื่อวิทยาศาสตร์ | ชื่อวงศ์ | ลักษณะวิสัย | ลักษณะเด่นของพืช | บริเวณที่พบ |
|--------------------|--|--------------------------------------|-----------|-------------|--|-----------------|
| 7-11000-023-044/2 | เข็มชมพูเข็ม จูจูบ เข็ม ปานามา (กรุงเทพฯ) | <i>Rondeletia leucophylla</i> | RUBIACEAE | ไม้พุ่ม | ดอกช่อแน่นสีชมพูเข้ม ท้องใบสีขาว | พื้นที่ 1 ไร่ 1 |
| 7-11000-023-045/12 | กุหลาบพันปี กุหลาบแดง (ภาคกลาง), คำ แดง (เชียงใหม่) | <i>Rhododendron delavayi</i> Franch. | ERICACEAE | ไม้พุ่ม | แผ่นใบด้านล่างมีเกล็ดขรุขระ และขนสีขาวเทาอมสี น้ำตาลเหลืองหนาแน่น | พื้นที่ 3 ไร่ 3 |